



中华人民共和国国家标准

GB/T 13734—2008
代替 GB/T 13734—1992

耳 穴 名 称 与 定 位

Nomenclature and location of auricular points

www.docin.com

2008-04-23 发布

2008-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 术语和定义	1
2.1 耳郭方位术语	1
2.2 耳郭表面解剖名称及有关术语	1
3 耳穴名称与定位的说明	5
4 耳穴名称与定位	5
4.1 耳轮穴位	5
4.2 耳舟穴位	6
4.3 对耳轮穴位	6
4.4 三角窝穴位	7
4.5 耳屏穴位	7
4.6 对耳屏穴位	7
4.7 耳甲穴位	8
4.8 耳垂穴位	9
4.9 耳背穴位	9
4.10 耳根穴位	9
附录 A(规范性附录) 图示	10
附录 B(规范性附录) 耳穴名称与定位命名原则及定位原则	27
附录 C(规范性附录) 耳郭基本标志点、线的划定及耳郭分区说明	28
附录 D(资料性附录) 耳穴名称与定位文献考	30
参考文献	59
耳穴中文名称索引	61

前 言

本标准代替 GB/T 13734—1992《耳穴名称与部位》，与 GB/T 13734—1992 相比，主要变化如下：

- 修改标准名称《耳穴名称与部位》为《耳穴名称与定位》；
- 将 GB/T 13734—1992 中“图例”调整为“图示”(本标准的附录 A；GB/T 13734—1992 的附录 A)；
- 增加耳穴名称与定位的命名原则、定位原则(本标准的附录 B)；
- 将 GB/T 13734—1992 中“耳郭基本标志线的划定”，“耳郭标志点、线的设定”，“耳郭分区说明”调整为规范性附录 C(本标准的附录 C；GB/T 13734—1992 的第 4 章、第 5 章、第 6 章)；
- 增加“4.1.6 耳尖前”，“4.1.8 耳尖后”；
- 调整 GB/T 13734—1992“术语和定义”中以下术语的描述：
 - 1) “后方”(本标准的 2.1.4；GB/T 13734—1992 的 2.4)；
 - 2) “下方”(本标准的 2.1.6；GB/T 13734—1992 的 2.6)；
 - 3) “耳轮”(本标准的 2.2.1.2.1；GB/T 13734—1992 的 3.1.2a)；
 - 4) “耳轮脚棘”(本标准的 2.2.1.2.3；GB/T 13734—1992 的 3.1.2c)；
 - 5) “耳轮结节”(本标准的 2.2.1.2.5；GB/T 13734—1992 的 3.1.2e)；
 - 6) “对屏尖”(本标准的 2.2.1.8.2；GB/T 13734—1992 的 3.1.8b)；
- 调整 GB/T 13734—1992“标准耳穴名称与部位”中以下定位的描述：
 - 1) “交感”(本标准的 4.3.7；GB/T 13734—1992 的 7.3.7)；
 - 2) “内分泌”(本标准的 4.7.21；GB/T 13734—1992 的 7.7.21)；
 - 3) “上耳根”(本标准的 4.10.1；GB/T 13734—1992 的 7.10.1)；
 - 4) “下耳根”(本标准的 4.10.3；GB/T 13734—1992 的 7.10.3)；
- 修改 GB/T 13734—1992 图 12 的耳背穴位编码 R_2 、 R_3 与所代表穴位的位置对应关系(本标准附录 A 的图 A.12；GB/T 13734—1992 的图 12)；
- 增加 GB/T 13734—1992 图 14、图 15 的扁桃体穴区中的分区线，使穴区与分区对应更明确(本标准附录 A 的图 A.14，图 A.15；GB/T 13734—1992 的图 14、图 15)；
- 增加有关耳穴名称和定位沿革的文献资料(本标准附录 D)及参考文献(本标准的参考文献)。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 为规范性附录，附录 D 为资料性附录。

本标准由国家中医药管理局提出。

本标准由中国针灸学会归口。

本标准负责起草单位：北京中医药大学。

本标准参加起草单位：中国针灸学会耳穴诊治专业委员会。

本标准主要起草人：周立群、赵百孝。

本标准参加起草人：刘姗姗、刘清国、王小红。

本标准于 1992 年 10 月首次发布。

耳 穴 名 称 与 定 位

1 范围

本标准规定了人体耳穴的名称和耳穴的标准定位。
本标准适用于耳穴名称与定位。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1 耳郭方位术语

2.1.1

耳郭正面 **front of the auricle**

耳郭的前外侧面,见图 A.1。

2.1.2

耳郭背面 **back of the auricle**

耳郭的后内侧面,统称耳背,见图 A.2。

2.1.3

前方 **anterior**

耳郭近面颊的一侧,见图 A.1,图 A.2。

2.1.4

后方 **posterior**

耳郭近乳突的一侧,见图 A.1,图 A.2。

2.1.5

上方 **superior**

耳郭近头顶的一侧,见图 A.1,图 A.2。

2.1.6

下方 **inferior**

耳郭近肩的一侧,见图 A.1,图 A.2。

2.1.7

内侧 **medial**

耳郭近正中矢状面的一侧,见图 A.3。

2.1.8

外侧 **lateral**

耳郭远正中矢状面的一侧,见图 A.3。

2.2 耳郭表面解剖名称及有关术语

2.2.1 耳郭正面

2.2.1.1 耳垂

2.2.1.1.1

耳垂 **lobe**

耳郭下部无软骨的部分,见图 A.4。

2.2.1.1.2

耳垂前沟 *anterior groove of the ear lobe*

耳垂与面部之间的浅沟,见图 A.4。

2.2.1.2 耳轮

2.2.1.2.1

耳轮 *helix*

耳郭外侧边缘的卷曲部分,见图 A.4。

2.2.1.2.2

耳轮脚 *helix crus*

耳轮深入耳甲的部分,见图 A.4。

2.2.1.2.3

耳轮脚棘 *spine of the helix crus*

耳轮脚和耳轮之间的隆起,见图 A.4。

2.2.1.2.4

耳轮脚切迹 *notch of the helix crus*

耳轮脚棘前方的凹陷处,见图 A.4。

2.2.1.2.5

耳轮结节 *helix tubercle*

耳轮外上方的膨大部分,见图 A.4。

2.2.1.2.6

耳轮尾 *helix cauda*

耳轮向下移行于耳垂的部分,见图 A.4。

2.2.1.2.7

轮垂切迹 *helix-lobe notch*

耳轮和耳垂后缘之间的凹陷处,见图 A.4。

2.2.1.2.8

耳轮前沟 *anterior groove of the helix*

耳轮与面部之间的浅沟,见图 A.4。

2.2.1.3 对耳轮

2.2.1.3.1

对耳轮 *antihelix*

与耳轮相对呈“Y”字形的隆起部,由对耳轮体、对耳轮上脚和对耳轮下脚三部分组成,见图 A.4。

2.2.1.3.5

轮屏切迹 **antihelix-antitragus notch**

对耳轮与对耳屏之间的凹陷处,见图 A.4。

2.2.1.4 耳舟

耳舟 **scapha**

耳轮与对耳轮之间的凹沟,见图 A.4。

2.2.1.5 三角窝

三角窝 **triangular fossa**

对耳轮上、下脚与相应耳轮之间的三角形凹窝,见图 A.4。

2.2.1.6 耳甲

2.2.1.6.1

耳甲 **concha**

部分耳轮和对耳轮、对耳屏、耳屏及外耳门之间的凹窝。由耳甲艇、耳甲腔两部分组成,见图 A.4。

2.2.1.6.2

耳甲艇 **cymba concha**

耳轮脚以上的耳甲部,见图 A.4。

2.2.1.6.3

耳甲腔 **cavum concha**

耳轮脚以下的耳甲部,见图 A.4。

2.2.1.7 耳屏

2.2.1.7.1

耳屏 **tragus**

耳郭前方呈瓣状的隆起,见图 A.4。

2.2.1.7.2

屏上切迹 **supratragic notch**

耳屏与耳轮之间的凹陷处,见图 A.4。

2.2.1.7.3

上屏尖 **apex of the upper tragus**

耳屏游离缘上隆起部,见图 A.4。

2.2.1.7.4

下屏尖 **apex of the lower tragus**

耳屏游离缘下隆起部,见图 A.4。

2.2.1.8.3

屏间切迹 **intertragic notch**

耳屏和对耳屏之间的凹陷处,见图 A.4。

2.2.1.9 外耳门

外耳门 **orifice of the external auditory meatus**

耳甲腔前方的孔窍,见图 A.4。

2.2.2 耳郭背面

2.2.2.1

耳轮背面 **back of the helix**

耳轮背部的平坦部分,见图 A.5。

2.2.2.2

耳轮尾背面 **back of the helix cauda**

耳轮尾背部的平坦部分,见图 A.5。

2.2.2.3

耳垂背面 **back of the ear lobe**

耳垂背部的平坦部分,见图 A.5。

2.2.2.4

耳舟隆起 **prominence of the scapha**

耳舟在耳背呈现的隆起,见图 A.5。

2.2.2.5

三角窝隆起 **prominence of the triangular fossa**

三角窝在耳背呈现的隆起,见图 A.5。

2.2.2.6

耳甲艇隆起 **prominence of the cymba concha**

耳甲艇在耳背呈现的隆起,见图 A.5。

2.2.2.7

耳甲腔隆起 **prominence of the cavum concha**

耳甲腔在耳背呈现的隆起,见图 A.5。

2.2.2.8

对耳轮上脚沟 **groove of the superior antihelix crus**

对耳轮上脚在耳背呈现的凹沟,见图 A.5。

2.2.2.9

对耳轮下脚沟 **groove of**

2.2.3 耳根

2.2.3.1

上耳根 superior auricular root

耳郭与头部相连的最上处,见图 A.5。

2.2.3.2

下耳根 inferior auricular root

耳郭与头部相连的最下处,见图 A.5。

3 耳穴名称与定位的说明

下列说明适用于耳穴名称与定位:

- a) 规定耳穴名称与定位的命名原则和定位原则,见附录 B。
- b) 划定耳郭基本标志线,设定耳郭标志点、线,对耳郭进行分区,见附录 C 及图 A.6~图 A.13。
- c) 耳穴曾用名、并用名及沿革文献,参见附录 D。
- d) 耳穴名称与定位书写格式为:耳穴中文名称 汉语拼音 穴位分区编号^a

- e) 耳穴名称与定位见图 A.14~图 A.17。

4 耳穴名称与定位

4.1 耳轮穴位

4.1.1 耳中 ěrzhōng (HX₁)

在耳轮脚处,即耳轮 1 区。

4.1.2 直肠 zhícháng (HX₂)

在耳轮脚前上方的耳轮处,即耳轮 2 区。

4.1.3 尿道 niàodào (HX₃)

在直肠上方的耳轮处,即耳轮 3 区。

4.1.4 外生殖器 wàishēngzhíqì (HX₄)

在对耳轮下脚前方的耳轮处,即耳轮 4 区。

4.1.5 肛门 gāngmén (HX₅)

在三角窝前方的耳轮处,即耳轮 5 区。

4.1.6 耳尖前 ěrjiānqián (HX₆)

在耳郭向前对折上部尖端的前部,即耳轮 6 区。

4.1.7 耳尖 ěrjiān (HX_{6,7})

在耳郭向前对折的上部尖端处,即耳轮 6、7 区交界处。

4.1.12 轮3 lúnsān (HX₁₁)

在轮2区下方的耳轮处,即耳轮11区。

4.1.13 轮4 lúnsì (HX₁₂)

在轮3区下方的耳轮处,即耳轮12区。

4.2 耳舟穴位

4.2.1 指 zhǐ (SF₁)

在耳舟上方处,即耳舟1区。

4.2.2 腕 wǎn (SF₂)

在指区的下方处,即耳舟2区。

4.2.3 风溪 fēngxī (SF_{1,2})

在耳轮结节前方,指区与腕区之间;即耳舟1、2区交界处。

4.2.4 肘 zhǒu (SF₃)

在腕区的下方处,即耳舟3区。

4.2.5 肩 jiān (SF_{4,5})

在肘区的下方处,即耳舟4、5区。

4.2.6 锁骨 suǒgǔ (SF₆)

在肩区的下方处,即耳舟6区。

4.3 对耳轮穴位

4.3.1 跟 gēn (AH₁)

在对耳轮上脚前上部,即对耳轮1区。

4.3.2 趾 zhǐ (AH₂)

在耳尖下方的对耳轮上脚后上部,即对耳轮2区。

4.3.3 踝 huái (AH₃)

在趾、跟区下方处,即对耳轮3区。

4.3.4 膝 xī (AH₄)

在对耳轮上脚中1/3处,即对耳轮4区。

4.3.5 髌 kuān (AH₅)

在对耳轮上脚的下1/3处,即对耳轮5区。

4.3.6 坐骨神经 zuòg

4.3.13 颈 jǐng (AH₁₂)

在对耳轮体前部下 1/5 处,即对耳轮 12 区。

4.3.14 颈椎 jǐngzhuī (AH₁₃)

在颈区后方,即对耳轮 13 区。

4.4 三角窝穴位

4.4.1 角窝上 jiǎowōshàng (TF₁)

在三角窝前 1/3 的上部,即三角窝 1 区。

4.4.2 内生殖器 nèishēngzhíqì (TF₂)

在三角窝前 1/3 的下部,即三角窝 2 区。

4.4.3 角窝中 jiǎowōzhōng (TF₃)

在三角窝中 1/3 处,即三角窝 3 区。

4.4.4 神门 shénmén (TF₄)

在三角窝后 1/3 的上部,即三角窝 4 区。

4.4.5 盆腔 pénqiāng (TF₅)

在三角窝后 1/3 的下部,即三角窝 5 区。

4.5 耳屏穴位

4.5.1 上屏 shàngpíng (TG₁)

在耳屏外侧面上 1/2 处,即耳屏 1 区。

4.5.2 下屏 xiàpíng (TG₂)

在耳屏外侧面上 1/2 处,即耳屏 2 区。

4.5.3 外耳 wàier (TG_{1u})

在屏上切迹前方近耳轮部,即耳屏 1 区上缘处。

4.5.4 屏尖 píngjiān (TG_{1p})

在耳屏游离缘上部尖端,即耳屏 1 区后缘处。

4.5.5 外鼻 wàibí (TG_{1,21})

在耳屏外侧面中部,即耳屏 1、2 区之间。

4.5.6 肾上腺 shèishàngxiàn (TG_{2p})

4.6.5 皮质下 pízhìxià (AT₄)

在对耳屏内侧面,即对耳屏4区。

4.6.6 对屏尖 duìpíngjiān (AT_{1,2,4,1})

在对耳屏游离缘的尖端,即对耳屏1、2、4区交点处。

4.6.7 缘中 yuánzhōng (AT_{2,3,4,1})

在对耳屏游离缘上,对屏尖与轮屏切迹之中点处,即对耳屏2、3、4区交点处。

4.6.8 脑干 nǎogàn (AT_{3,4,1})

在轮屏切迹处,即对耳屏3、4区之间。

4.7 耳甲穴位

4.7.1 口 kǒu (CO₁)

在耳轮脚下方前1/3处,即耳甲1区。

4.7.2 食道 shí dào (CO₂)

在耳轮脚下方中1/3处,即耳甲2区。

4.7.3 贲门 bēnmén (CO₃)

在耳轮脚下方后1/3处,即耳甲3区。

4.7.4 胃 wèi (CO₄)

在耳轮脚消失处,即耳甲4区。

4.7.5 十二指肠 shíèrzhǐcháng (CO₅)

在耳轮脚及部分耳轮与AB线之间的后1/3处,即耳甲5区。

4.7.6 小肠 xiǎocháng (CO₆)

在耳轮脚及部分耳轮与AB线之间的中1/3处,即耳甲6区。

4.7.7 大肠 dàcháng (CO₇)

在耳轮脚及部分耳轮与AB线之间的前1/3处,即耳甲7区。

4.7.8 阑尾 lánwěi (CO_{6,7,1})

在小肠区与大肠区之间,即耳甲6、7区交界处。

4.7.9 艇角 tǐngjiǎo (CO₈)

4.7.18 气管 qìguǎn (CO₁₆)

在心区与外耳门之间,即耳甲16区。

4.7.19 肺 fèi (CO₁₄)

在心、气管区周围处,即耳甲14区。

4.7.20 三焦 sānjiāo (CO₁₇)

在外耳门后下,肺与内分泌区之间,即耳甲17区。

4.7.21 内分泌 nèifēnmì (CO₁₈)

在屏间切迹内,耳甲腔的底部,即耳甲18区。

4.8 耳垂穴位

4.8.1 牙 yá (LO₁)

在耳垂正面前上部,即耳垂1区。

4.8.2 舌 shé (LO₂)

在耳垂正面中上部,即耳垂2区。

4.8.3 颌 hé (LO₃)

在耳垂正面后上部,即耳垂3区。

4.8.4 垂前 chuíqián (LO₄)

在耳垂正面前中部,即耳垂4区。

4.8.5 眼 yǎn (LO₅)

在耳垂正面中央部,即耳垂5区。

4.8.6 内耳 nèiěr (LO₆)

在耳垂正面后中部,即耳垂6区。

4.8.7 面颊 miànjiá (LO_{5,6})

在耳垂正面眼区与内耳区之间,即耳垂5、6区交界处。

4.8.8 扁桃体 biǎntáotǐ (LO_{7,8,9})

在耳垂正面下部,即耳垂7、8、9区。

4.9 耳背穴位

4.9.1 耳背心 ěrbèixīn (P₁)

在耳背上部,即耳背1区。

附录 A
(规范性附录)
图 示

- 轮廓线
- 外侧面基本标志线和穴区线
- 内侧面基本标志线和穴区线
- 外侧面以点表示的穴位
- △ 被遮盖的以点表示的穴位
- ⊙ 外耳门
- *** 同一穴区中的分区线




图 A.1 耳郭方位示意图(正面)




图 A.2 耳廓方位示意图(背面)




图 A.3 耳郭方位示意图(内侧面)




图 A.4 耳郭解剖名称示意图(正面)




图 A.5 耳郭解剖名称示意图(背面)




图 A.6 耳郭基本标志线示意图





图 A.7 补充设定的耳廓标志点或线条示意图






图 A.9 标准耳郭分区示意图(背面)




图 A. 10 标准耳郭分区示意图(内侧面)




图 A.11 标准耳郭分区代号示意图(正面)




图 A.12 标准耳郭分区代号示意图(背面)




图 A. 13 标准耳郭分区代号示意图(内侧面)




图 A.15 标准耳穴定位示意图(正面)




图 A.16 标准耳穴定位示意图(背面)




图 A.17 标准耳穴定位示意图(内侧面)

附录 B

(规范性附录)

耳穴名称与定位命名原则及定位原则

B.1 耳穴名称与定位的命名原则

B.1.1 本标准选取耳穴的原则:有广泛实践基础、临床上常用的、诊疗效果较好的耳穴。

B.1.2 本标准耳穴命名的原则:在符合上述原则的基础上,还应具备下列特征之一:

B.1.2.1 目前国际上公认或使用。如:肾上腺、交感等。

B.1.2.2 见于传统医学文献并经实践证明确有应用价值。如:耳中、耳尖等。

B.1.2.3 根据人体部位和器官命名。如:心、肩等。

B.1.2.4 用耳郭解剖术语命名。如:上耳根、角窝中等。

B.1.3 本标准不采用以下列方法命名的耳穴:

- a) 以病症术语命名的耳穴名称;
- b) 以某些诊治功能命名的耳穴名称;
- c) 以药物名称命名的耳穴名称;
- d) 与入选本标准耳穴处于同一穴位区域内的其他耳穴名称;
- e) 具有性别特征的耳穴名称;
- f) 其他不符合入选特征的耳穴名称。

B.2 耳穴名称与定位的定位原则

B.2.1 本标准采用以分区定位为主,区、点结合的方法定位。

B.2.2 明确规定表示耳郭位置的名词术语。

B.2.3 介绍与耳穴分区定位有关的耳郭表面解剖名称。

B.2.4 根据耳郭表面解剖结构补充设立若干耳穴定位标志点。

B.2.5 划定耳郭基本标志线,澄清各解剖结构之分野,在各部位结构的基础上以解剖标志分区标定穴位。

B.2.6 穴位(区)覆盖全部耳郭表面。

附录 C

(规范性附录)

耳郭基本标志点、线的划定及耳郭分区说明

C.1 耳郭基本标志线的划定

下列耳郭基本标志线的划定适用于耳郭分区的说明:

- a) 耳轮内缘:即耳轮与耳郭其他部分的分界线。是指耳轮与耳舟、对耳轮上、下脚、三角窝及耳甲等部的折线,见图 A.6;
- b) 耳甲折线:是指耳甲内平坦部与隆起部之间的折线,见图 A.6;
- c) 对耳轮脊线:是指对耳轮体及其上、下脚最凸起处之连线,见图 A.6;
- d) 耳舟凹沟线:是指沿耳舟最凹陷处所作的连线,见图 A.6;
- e) 对耳轮耳舟缘:即对耳轮与耳舟的分界线。是指对耳轮(含对耳轮上脚)脊与耳舟凹沟之间的中线,见图 A.6;
- f) 三角窝凹陷处后缘:是指三角窝内较低平的三角形区域的后缘,见图 A.6;
- g) 对耳轮三角窝缘:即对耳轮上、下脚与三角窝的分界线。是指对耳轮上、下脚脊与三角窝凹陷处后缘之间的中线,见图 A.6;
- h) 对耳轮耳甲缘:即对耳轮与耳甲的分界线。是指对耳轮(含对耳轮下脚)脊与耳甲折线之间的中线,见图 A.6;
- i) 对耳轮上脚下缘:即对耳轮上脚与对耳轮体的分界线。是指从对耳轮上、下脚分叉处向对耳轮耳舟缘所作的垂线,见图 A.6;
- j) 对耳轮下脚后缘:即对耳轮下脚与对耳轮体的分界线。是指从对耳轮上、下脚分叉处向对耳轮耳甲缘所作的垂线,见图 A.6;
- k) 耳垂上线(亦作为对耳屏耳垂缘和耳屏耳垂缘):即耳垂与耳郭其他部分的分界线。是指过屏间切迹与轮垂切迹所作的直线,见图 A.6;
- l) 对耳屏耳甲缘:即对耳屏与耳甲的分界线。是指对耳屏内侧面与耳甲的折线,见图 A.6;
- m) 耳屏前缘:即耳屏外侧面与面部的分界线。是指沿耳屏前沟所作的直线,见图 A.6;
- n) 耳轮前缘:即耳轮与面部的分界线。是指沿耳轮前沟所作的直线,见图 A.6;
- o) 耳垂前缘:即耳垂与面颊的分界线。是指沿耳垂前沟所作的直线,见图 A.6。

C.2 耳郭标志点、线的设定

下列耳郭标志点、线的设定适用于耳郭分区的说明:

- a) 在耳轮内缘上,设耳轮脚切迹至对耳轮下脚间中、上 1/3 交界处为 A 点,见图 A.7;
- b) 在耳甲内,由耳轮脚消失处向后作一水平线与对耳轮耳甲缘相交,设交点为 D 点,见图 A.7;
- c) 设耳轮脚消失处至 D 点连线的中、后 1/3 交界处为 B 点,见图 A.7;
- d) 设外耳道口后缘上 1/4 与下 3/4 交界处为 C 点,见图 A.7;
- e) 从 A 点向 B 点作一条与对耳轮耳甲艇缘弧度大体相仿的曲线,见图 A.7;
- f) 从 B 点向 C 点作一条与耳轮脚下缘弧度大体相仿的曲线,见图 A.7。

C.3 耳郭分区的说明

C.3.1 耳轮

耳轮脚为耳轮 1 区。耳轮脚切迹到对耳轮下脚上缘之间的耳轮分为三等分,自下而上依次为耳轮

附录 D
(资料性附录)
耳穴名称与定位文献考

D.1 耳中 ěrzhōng (HX₁)

定位:在耳轮脚处,即耳轮 1 区。

曾用名或并用名:膈

文献汇考:

- (1)《备急千金要方》:“耳中穴,在耳门孔上横梁是”。
- (2)《P. Nogier 译文》:“耳轮脚则相当于横膈膜”。
- (3)《针灸经外奇穴图谱》:“耳中”“位于耳廓内,耳轮脚之中点处”。
- (4)《耳廓解剖穴位挂图》:“耳中”位于“耳轮脚的中央”。
- (5)《耳穴标准化方案》:“耳中”位于“耳轮脚”。

按语:各家文献描述和/或附图所示基本一致。《备急千金要方》“耳门孔上横梁”意指耳轮脚。《P. Nogier 译文》“横膈膜”即指膈穴区。现据《备急千金要方》定位如上。

D.2 直肠 zhícháng (HX₂)

定位:在耳轮脚棘前上方的耳轮处,即耳轮 2 区。

曾用名或并用名:直肠下段

文献汇考:

- (1)《P. Nogier 译文》:“外生殖器以及尿道和直肠后部位于耳轮高缘”。
- (2)《耳针治疗 1500 例的临床分析》:该文图Ⅲ示:“直肠下段”在耳轮升支起始部,现耳轮 2 区。
- (3)《常用新医疗法手册》:“直肠下段”位于“在与大肠穴同水平的耳轮部”。
- (4)《耳针》:“直肠下段”位于“与大肠穴同一水平的耳轮处”。
- (5)《耳穴标准化方案》:“直肠”位于“近屏上切迹的耳轮处,与大肠同水平”。

按语:各家文献描述和/或附图所示基本一致。《P. Nogier 译文》中的“耳轮高缘”考该文附图疑为耳轮前缘之误。现从《耳穴标准化方案》定位如上。

D.3 尿道 niàodào (HX₃)

定位:在直肠上方的耳轮处,即耳轮 3 区。

曾用名或并用名:尿道₁

文献汇考:

- (1)《P. Nogier 译文》:“外生殖器以及尿道和直肠后部位于耳轮高缘”。
- (2)《耳针治疗 1500 例的临床分析》:该文图Ⅲ示:“尿道”位于直肠下段穴上方的耳轮升支处,平对耳轮下脚下缘,现耳轮 3 区。
- (3)《常用新医疗法手册》:“尿道₁”位于“在与膀胱穴同水平的耳轮部”。
- (4)《耳针疗法》(科学):“尿道”位于“在与膀胱同

D.4 外生殖器 wàishēngzhíqì (HX₄)

定位:在对耳轮下脚前方的耳轮处,即耳轮4区。

曾用名或并用名:尿道、直肠后部、外生殖器₁

文献汇考:

- (1)《P. Nogier 译文》:“外生殖器以及尿道和直肠后部位于耳轮高缘”。
- (2)《常用新医疗法手册》:“外生殖器”位于“在与对耳轮下脚同水平的耳轮部”。
- (3)《耳穴标准化方案》:“外生殖器”位于“尿道上方,与交感同水平的耳轮处”。
- (4)《耳穴诊断学》:“外生殖器”位于“尿道上方,与交感同水平的耳轮处”。

按语:各家文献描述和/或附图所示基本一致。《P. Nogier 译文》中的“耳轮高缘”考该文附图疑为耳轮前缘之误。现从《耳穴标准化方案》定位如上。

D.5 肛门 gāngmén (HX₅)

定位:在三角窝前方的耳轮处,即耳轮5区。

曾用名或并用名:痔核点

文献汇考:

- (1)《耳针》:“痔核点”位于“耳尖内侧,降压点上方”。
- (2)《耳穴标准化方案》:“肛门”位于“与对耳轮上脚前缘相对的耳轮处”。
- (3)《耳廓诊治与养生》:“肛门(又名:‘痔核点’)”位于“‘外生殖器’上方、与‘内生殖器’同一水平的耳轮处”。
- (4)《耳穴诊断治疗学》:“肛门”位于“在与对耳轮上脚前缘相对的耳轮上”。

按语:诸文献所述位置大体处于同一区域内,《耳针》中的“降压点”位于“三角窝靠近对耳轮上脚的末端部”,“上方”指降压点上方的耳轮处,“耳尖内侧”据附图所示应理解为耳尖前下方。

D.6 耳尖前 ěrjiānqián (HX₆)

定位:在耳郭向前对折上部尖端的前部,即耳轮6区。

曾用名或并用名:耳涌、感冒、痔核点

文献汇考:

- (1)《银海精微》:“问曰人之患眼偏正头痛者何也答曰……灸穴:……耳尖二穴……”。
- (2)《耳针研究》:该文图附-14示:“耳涌”位于耳尖前部,现耳轮6区。
- (3)《耳穴诊治法》:“感冒”位于“对耳轮上脚上缘的微前方,耳轮的边缘部”。
- (4)《中国医学百科全书(针灸学)》:“耳尖前,曾用名痔核点”位于“与对耳轮上脚下缘同水平的耳轮处”,该文“常用耳穴图”示:“耳尖前”在现耳轮6区

(5)《耳穴标准化方案》：“在耳轮上，自耳轮结节下缘至耳垂下缘中点划为五等分，共六个点，由上而下依次为轮 1、轮 2、轮 3、轮 4、轮 5、轮 6”。第四点为轮 4。

按语：各家文献描述和/或附图所示基本一致。

D.14 指 zhǐ (SF₁)

定位：在耳舟上方处，即耳舟 1 区。

曾用名或并用名：阑尾点。

文献汇考：

(1)《P. Nogier 译文》：“手和手指紧靠于耳轮上缘”。

(2)《常用新医疗法手册》：“指”位于“在耳轮结节上缘的耳舟部”；“阑尾点”“在耳轮与对耳轮上脚交界处的耳舟部”。

(3)《耳针》：“指”位于“在耳舟上端的耳轮下缘”；“阑尾点”位于“在耳舟部分内共有三个点，一点在指穴的略上方”。

(4)《耳穴标准化方案》：“将耳舟分为五等分，自上而下：第一等分为指”。

(5)《耳穴压丸疗法》：“将耳舟分为 5 等分，自上而下第 1 等分为指”。

按语：各家文献描述和/或附图所示基本一致。

D.15 腕 wǎn (SF₂)

定位：在指区的下方处，即耳舟 2 区。

曾用名或并用名：无

文献汇考：

(1)《P. Nogier 译文》：该文图二示：“腕”在与对耳轮下脚上缘同水平的耳舟处，现耳舟 2 区。

(2)《常用新医疗法手册》：“腕”位于“在耳轮结节突起处的耳舟部”。

(3)《耳针》：“腕”位于“将锁骨与指两穴位之间的耳舟分四个等分，……在锁骨上方第四个等分区域内”。

(4)《针灸学》(3 版)：“腕”位于“在耳轮结节突起处的耳舟部”。

(5)《耳穴标准化方案》：“将耳舟分为五等分，自上而下：第二等分为腕”。

按语：各家文献描述和/或附图所示基本一致。

D.16 风溪 fēngxī (SF_{1,2})

定位：在耳轮结节前方，指区与腕区之间，即耳舟 1、2 区交界处。

曾用名或并用名：荨麻疹、荨麻疹区、荨麻疹点、结节

D.56 口 kǒu (CO₁)

定位:在耳轮脚下方前 1/3 处,即耳甲 1 区。

曾用名或并用名:无

文献汇考:

(1)《耳针治疗 1500 例的临床分析》:该文图Ⅲ示:“口”在外耳道开口的上方,现耳甲 1 区。

(2)《耳针》:“口”位于“在耳轮脚下,外耳道的外上方处”。

(3)《耳穴标准化方案》:“口”位于“耳轮脚下方前 1/3 处”。

(4)《耳压疗法》:“口”位于“在耳轮脚下缘,外耳道口的上方处”。

按语:各家文献描述和/或附图所示基本一致。

D.57 食道 shídào (CO₂)

定位:在耳轮脚下方中 1/3 处,即耳甲 2 区。

曾用名或并用名:无

文献汇考:

(1)《P. Nogier 译文》:该文图三示:“5a=食道”在耳甲腔上部,耳轮脚下方的前半部,现耳甲 2 区。

(2)《常用新医疗法手册》:“食道”位于“在耳轮脚下方偏内的二分之一处”。

(3)《耳针疗法》(科学):“食道”位于“耳轮脚中点下方”。

(4)《耳针》:“食道”位于“在耳轮脚下缘,口、胃的中、内 1/3 交界处”。

(5)《中国针灸学概要》:“食道”位于“耳轮脚下方前 2/3 处”。

(6)《针灸学》(4 版):“食道”位于“在耳轮脚下方内 2/3 处”。

(7)《耳穴标准化方案》:“食道”位于“耳轮脚下方中 1/3 处”。

按语:各家文献描述和/或附图所示基本一致。

D.58 贲门 bēnmén (CO₃)

定位:在耳轮脚下方后 1/3 处,即耳甲 3 区。

曾用名或并用名:无

文献汇考:

曾用名或并用名:无

文献汇考:

- (1)《针灸学讲义》:“肾脏(耳甲艇上后部)”。
- (2)《耳针疗法》(科学):“肾”位于“小肠的直上方”。
- (3)《针灸学》(4版):“肾”位于“在对耳轮下脚的下缘,小肠穴直上方”。
- (4)《耳针研究》:“肾”位于“对耳轮下脚下缘,小肠穴直上”。
- (5)《耳穴标准化方案》:“肾”位于“对耳轮上、下脚分叉处下方”。

按语:各家文献描述和/或附图所示基本一致。

D.67 输尿管 shūniàoguǎn (CO_{9,10})

定位:在肾区与膀胱区之间,即耳甲 9、10 区交界处。

曾用名或并用名:无

文献汇考:

- (1)《常用新医疗法手册》:“输尿管”位于“在膀胱穴的后方”。
- (2)《耳针疗法》(科学):“输尿管”位于“膀胱与肾之间”。
- (3)《耳针》(修):“输尿管”位于“在膀胱与肾穴之间”。
- (4)《针法灸法学》:“输尿管”位于“肾穴与膀胱穴之间”。
- (5)《针灸学》(江苏):“输尿管”位于“肾与膀胱两穴之间”。
- (6)《耳穴标准化方案》:“输尿管”位于“肾与膀胱两穴之间”。
- (7)《实用耳穴诊疗法》:“输尿管”位于“肾与膀胱穴之间”。

按语:各家文献描述和/或附图所示基本一致。

D.68 胰胆 yídǎn (CO₁₁)

定位:在耳甲艇的后上部,即耳甲 11 区。

曾用名或并用名:胰脏、胆囊

文献汇考:

(1)《P. Nogier 译文》:该文图三示:“3=胰脏”(左耳郭图)、“3a=胆囊”(右耳郭图)在耳甲艇后下方,现耳甲 11 区,左耳为胰脏,右耳为胆囊。

- (2)《针灸学讲义》:“胆囊(耳甲艇后下——右)”、“胰腺(耳甲艇后下——左)”。
- (3)《耳针治疗 1500 例的临床分析》:该文图Ⅲ示:“胰胆”在肝、肾两穴之间,现耳甲 11 区。
- (4)《常用新医疗法手册》:“胰胆”位于“在肾穴与肝穴之间(左耳为胰,右耳为胆)”。
- (5)《耳针疗法》(科学):“胰胆”位于“肝与肾之间”。
- (6)《中国针灸学概要》:“胰胆”位于“在肝穴和肾穴之间”。
- (7)《耳穴标准化方案》:“胰胆”位于“肝肾两穴之间”。

按语:各家文献描述和/或附图所示基本一致。考《常用新医疗法手册》、《中国针灸学概要》、《耳针疗法》(科学)等文献之附图,所述胰胆穴位置均在肝肾两穴之间,即耳甲艇后上部,现据《耳穴标准化方案》以定位。

小),右耳为右侧肝叶(较大)。

(2)《针灸学讲义》:“肝脏(耳轮脚之后方)”。

(3)《常用新医疗法手册》:“肝”位于“在胃穴的后方”。

(4)《中国针灸学概要》:“肝”位于“在胃穴和十二指肠穴的后方”。

(5)《针灸学》(4版):“肝”位于“胃、十二指肠穴的后方”。

(6)《耳针》(修):“肝”位于“在胃穴的外上方,耳甲艇边缘处”。

(7)《耳穴标准化方案》:“肝”位于“在耳甲艇的后下部”。

按语:各家文献描述和/或附图所示基本一致。考《常用新医疗法手册》、《针灸学》(4版)、《耳针》(修)等文献之附图,所述肝穴位置均在耳甲艇的后下部,现据《耳穴标准化方案》以定位。

D.70 艇中 tǐngzhōng (CO_{6,10})

定位:在小肠区与肾区之间,即耳甲 6、10 区交界处。

曾用名或并用名:腹水点、脐中、腹水、醉点、前腹膜、后腹膜

文献汇考:

(1)《耳针》:“腹水点”位于“在肾、胰胆、小肠三穴位之中间。”该文图示:腹水点居耳甲艇中央,现耳甲 6、10 区交界处。

(2)《耳穴标准化方案》:“艇中”位于“耳甲艇中央”。

(3)《中国针灸大全(针灸学基础)》:“艇中”位于“耳甲艇中央”。

(4)《中国医学百科全书(针灸学)》:“艇中”位于“耳甲艇中央”。

(5)《耳廓诊治与养生》:“艇中(又名:‘脐中’、‘腹水’、‘醉点’、‘前腹膜’、‘后腹膜’)”位于“在‘耳甲艇’中间”。

按语:各家文献描述和/或附图所示基本一致。

D.71 脾 pí (CO₁₃)

定位:在 BD 线下方,耳甲腔的后上部,即耳甲 13 区。

曾用名或并用名:无

文献汇考:

(1)《P. Nogier 译文》:该文图三左耳郭图示:“脾位于 11”在耳甲腔后部,现耳甲 13 区。

(2)《耳针疗法》(科学):“脾”位于“左耳胃后下方”

按语：各家文献描述和/或附图所示基本一致。

D.92 耳迷根 ěrmígēn (R₂)

定位：在耳轮脚后沟的耳根处。

曾用名或并用名：无

文献汇考：

- (1)《针刺麻醉》：“耳迷根”位于“耳廓背面与乳突中点的交界处，相当于耳轮脚水平的耳根部”。
- (2)《针灸学》(3版)：“耳迷根”位于“在耳廓背与乳突交界处(相当于耳轮脚同水平)的耳根部”。
- (3)《中国针灸学概要》：“耳迷根”位于“耳廓背面与乳突交界处(相当于耳轮脚相平的耳根中部)”。
- (4)《耳针研究》：“耳迷根”位于“耳背与乳突交界之耳根部，与耳轮脚同水平”。
- (5)《耳穴标准化方案》：“耳迷根”位于“耳背与乳突交界的根部，耳轮脚对应处”。

按语：各家文献描述和/或附图所示基本一致。

D.93 下耳根 xiàěrgēn (R₃)

定位：在耳郭与头部相连的最下处。

曾用名或并用名：郁中、脊髓₂

文献汇考：

- (1)《中医学》：“下耳根”位于“耳壳下缘与面部皮肤交界处”。
- (2)《耳针》：“脊髓₂”位于“在乳突前，耳根下缘”。
- (3)《针灸经外奇穴图谱》：“郁中”位于“位于面部，耳轮棘前缘一穴，耳垂下缘相平一穴，左右计四穴”。

(4)《耳穴标准化方案》：“下耳根”位于“耳根最下缘”。

(5)《耳穴诊断学》：“下耳根”位于“耳根最下缘”。

按语：各家文献描述和/或附图所示基本一致。

www.docin.com

- [40] 耳穴诊断学委员会. 耳穴诊断学. 北京: 人民卫生出版社, 1990.
- [41] 刘森亭. 耳穴贴压疗法. 西安: 陕西科学技术出版社, 1991.
- [42] 杨兰绪. 耳穴压丸疗法. 南京: 江苏科学技术出版社, 1991.
- [43] 刘士佩. 耳廓诊治与养生. 上海: 上海教育出版社, 1991.
- [44] 黄丽春. 耳穴诊断治疗学. 北京: 科学技术文献出版社, 1991.

www.docin.com

